

Liste de contrôle de vaccination

NOM

DATE DE NAISSANCE

Écrivez votre nom complet et votre date de naissance. Montrez-le à votre médecin et demandez-lui de mettre à jour vos vaccinations et de les enregistrer dans la colonne de droite. Il doit écrire le nom du vaccin, la date indiquée et signer et tamponner chacun.

Covid-19	<p>2 doses sont désormais obligatoires pour tous à partir de 5 ans.</p> <p>Apportez 2 papiers imprimés avec les 2 dates de vaccination contre le Covid 19. Aucun code QR accepté. Votre dossier sera bloqué sans preuve des 2 dates.</p>		
Diptérie, tétanos, coqueluche et poliomyélite	<p>À faire si pas de booster pendant 10 ans.</p> <p><i>Il est nécessaire d'avoir eu un rappel de la poliomyélite au cours des 4 à 52 dernières semaines si vous vivez ou avez passé plus de 4 semaines en Afghanistan, au Bénin, au Burkina Faso, au Cameroun, en République Centrafricaine, au Tchad, en République démocratique du Congo, à Djibouti, en Égypte, en Éthiopie, en Gambie, en Guinée, en Guinée-Bissau, en Iran, au Libéria, à Madagascar, au Malawi, en Mauritanie, au Mozambique, au Niger, au Nigéria, au Pakistan, République du Congo, Sénégal, Sierra Leone, Somalie, Soudan du Sud, Tadjikistan, Ouganda, Ukraine et Yémen.</i></p>		
Hépatite B	<p>Tous doivent être vaccinés contre l'hépatite B jusqu'à 59 ans inclus.</p> <p>Au moins le premier vaccin de la série de 3</p>		

<p>Rubéole, oreillons, rougeole (ROR)</p>	<p>A faire si vous êtes né à partir de 1957. Si vous n'avez pas de preuve écrite de vaccination, il est nécessaire de vous faire vacciner Si vous préférez, faites un test sanguin pour voir si vous êtes immunisé contre les 3 maladies. Demandez une ordonnance à votre médecin. Si vous n'êtes immunisé que contre 1 ou 2 de ces maladies, vous devriez être vacciné à nouveau avec le ROR. Les vaccins individuels n'existent pas. Des antécédents de rubéole, d'oreillons, de rougeole ne suffisent pas comme preuve d'immunité. Vaccin contre-indiqué en cas de grossesse</p>		
<p>Varicelle</p>	<p>Si vous n'avez jamais eu la varicelle, vous devriez vous faire vacciner. Si vous préférez, vous pouvez faire un test sanguin pour voir si vous êtes immunisé. Demandez une ordonnance à votre médecin. Si vous n'êtes pas immunisé, vous devez être vacciné à nouveau. Des antécédents de varicelle ne suffiront que si vous avez la date notée par un médecin. Vaccin contre-indiqué en cas de grossesse</p>		
<p>Grippe (grippe saisonnière)</p>	<p>Le vaccin est obligatoire pendant la saison grippale (début octobre à fin janvier, tant que le vaccin reste disponible dans les pharmacies). Vérifiez la disponibilité chez votre pharmacien.</p>		
<p>Pneumocoque</p>	<p>Le vaccin antipneumococcique est obligatoire à partir de 65 ans. Les Centers for Disease Control (CDC) des États-Unis appellent à une première vaccination avec le vaccin antipneumococcique PPSV23</p>		